

جداسازی و شناسایی ویروس‌های عامل ایجاد علائم موزائیک چندرقند در کرج

Isolation and identification of viruses causing sugar beet Mosaic symptoms in Karaj

صادق جلالی^۱، محمود اخوت^۲، غلامحسین مصاحبی^۲ و محمد ناصر ارجمند^۳

چکیده

از مناطق مختلف چندرکاری کرج دو ویروس که علائم موزائیک را نشان میدادند جدا و در دو گروه قرار گرفتند، دامنه میزبانی جدایه‌های گروه اول محدود به گیاهان خانواده اسفناج (*Chenopodiaceae*) و تاج خروس (*Amaranthaceae*) بود. عصاره گیاهی حاوی این جدایه‌ها مربوط به ویروس موزائیک چندرقند (Beet Mosaic Virus) در آزمایش سرولوژیک نشت متقابل در آگار در برابر آنتی‌سرم واکنش مثبت نشان داد و در مطالعات میکروسکپ الکترونی پیکره‌های ویروس به صورت رشته‌های خمش‌پذیر به طول ۷۴۰-۷۲۰ نانومتر مشاهده شد. درجه حرارت بی‌اثر شدن ویروس در مدت ۱۰ دقیقه ۵۵ درجه سانتیگراد، حد نهایی رقت آن 10^{-3} و پایداری آن در شرایط آزمایشگاه دو روز تعیین گردید. این ویروس توسط شته سبز هلو (*Myzus persicae*) بعد از یک دقیقه تغذیه از گیاه آلوده با کارائی $53/3$ به گیاهان سالم چندر انتقال یافت. جدایه‌های گروه دوم که از نمونه‌های چندرقند مناطق شهریار و کمال‌آباد جدا گردید، روی لوبيا چشم بلبلی (*Vicia fabae*), باقلاء (*Vigna unquiculata*) و *Chenopodium spp.* لکه‌های موضعی به صورت نکروتیک ایجاد کرده و در گیاهانی از انواع سلمک (*Cucurbitaceae*) و بادمجانیان (*Solanaceae*) سیستمیک شد. در آزمایش سرولوژیک نشت متقابل در آگار در برابر استرین تیپ ویروس موزائیک خیار (*Cucumber Mosaic Virus*) واکنش مثبت نشان داد و در مطالعات میکروسکپ الکترونی پیکره‌های چندوجهی آن به قطر ۲۸-۳۰ نانومتر مشاهده شد. درجه حرارت بی‌اثر شدن آن در مدت ۱۰ دقیقه ۶۰ درجه سانتیگراد، حد نهایی رقت آن 10^{-4} و پایداری آن در آزمایشگاه یک روز تعیین گردید. این ویروس بوسیله شته سبز هلو از بوته‌های آلوده با کارائی $11/7$ درصد به بوته‌های سالم انتقال یافت.

واژه‌های کلیدی: چندرقند، ویروس موزائیک، جداسازی، جدایه‌ها

۱ - مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

۲ - دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

۳ - مؤسسه تحقیقات چندرقند - کرج

یونجه (Alfalfa mosaic virus) نیز از مزارع چندرقند که در مجاور مزارع یونجه در ایالت کالیفرنیا بود، گزارش شده است (Shepherd et al. 1965). ویروس موزائیک چندرقند در سال ۱۳۴۲ از کرج و سایر مناطق چندرقند کاری ایران مانند اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شده است (رضائیان ۱۳۴۸). میزان خسارت این ویروس روی عملکرد ریشه و قند به ترتیب ۳۳ و یک درصد برآورد شده است (علیزاده ۱۳۴۹). گونه‌هایی از ۱۰ خانواده گیاهی به طور مصنوعی توسط ویروس موزائیک چندرقند آلوده شده و نژادی از آن به نام BMV-y (روی سیبزمینی آفریقائی (*Dioscorea alata*) ایجاد موزائیک نموده است (Porth et al. 1987). این ویروس قادر است به طور طبیعی انواع چندر *Spinacia oleracea*, *Beta vulgaris* نخودفرنگی *Pisum sativum* و علف‌های هرزی مانند تاج خروس (*Amaranthus spp.*) و شیر تیغک (*Sonchus sp.*) را آلوده کند (Bennet, 1949). ویروس موزائیک خیار نیز یکی از شایع‌ترین ویروس‌های گیاهی است و به طور طبیعی حدود ۱۰۰۰ گونه گیاهی از ۴۰ خانواده از جمله سبزی‌ها، گیاهان زراعی و حتی درختان میوه مانند موز (*Mosa sp.*) و آلو (*Smith, 1972*). *Pronus sp.* را آلوده می‌نماید (*Smith, 1972*). این ویروس به راحتی توسط شته سبز هلو به گیاهان میزبان انتقال یافته و نژادهای متعددی از آن تاکنون شناخته شده است (Francki et al. 1979). این ویروس توسط سورین (Severin) از مزارع چندرقند

مقدمه

چندرقند (*Beta vulgaris L.*) یکی از مهم‌ترین گیاهان خانواده اسفناجیان می‌باشد و از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در کشور ما سطح زیرکشت آن ۱۸۰ هزار هکتار و متوسط عملکرد محصول آن ۲۶۷۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد گردیده است (آمارنامه کشاورزی ۱۳۷۸) که بخشی از کاهش عملکرد آن به واسطه وجود آفات و بیماری‌های گوناگون است. در بین عوامل بیماری‌زای مختلف چون قارچ‌ها، باکتری‌ها و نماتودها، بیماری‌های ویروسی خسارت زیادی را به این محصول وارد می‌کند (Makhopadhyay, 1987). ویروس‌ها علاوه بر کاهش عملکرد ریشه در تقلیل قند نیز نقش داشته و علاوه بر آلودگی روی یک محصول، توسط ناقلین از جمله شته‌ها و سایر حشرات مکنده به سایر گیاهان زراعی و علف‌های هرز انتقال می‌یابند. نظر به اینکه بروز علائم موزائیک در چندرقند ممکن است در اثر عوامل ویروسی متعددی حادث شود، این تحقیق در منطقه کرج بررسی شد تا ضمن شناسایی این عوامل، راههای انتقال و سایر گیاهان میزبان نیز شناسایی گردد. در جهان سه نوع ویروس به عنوان عوامل بروز موزائیک روی چندرقند شناخته شده که ویروس موزائیک چندرقند (Beet mosaic virus) و Cucumber mosaic virus (virus) از مهم‌ترین و شایع‌ترین آنها روى چندرقند در جهان می‌باشند (Whitney & Duffus 1986).

چشم بلبلی *Vicia unguiculata* و باقالا *faba* مایه‌زنی گردید. گیاهان خانواده کدوئیان (خیار و کدو) و بقولات (نوع لوپیا) را در مرحله دو برگی و توتون، گل تکمه‌ای، سلمک، باقالا در مرحله سه تا هشت برگی مایه‌زنی شدند. گیاهان مایه‌زنی شده تا چند ساعت در سایه و سپس در نور معمولی و دمای 26 ± 2 درجه سانتیگراد در گلخانه نگهداری شدند (Walkey 1985).

۳- خالص سازی بیولوژیک

با توجه به نوع علائم ایجاد شده در گیاهان محک و آزمون‌های سرولوژیک، برای جداسازی و خالص سازی بیولوژیک ویروس‌ها از تک لکه استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا لکه‌های کلروتیک موضعی و منفرد روی برگ گیاهان سلمک و باقالا انتخاب و به کمک اسکالپل استریل آن تک لکه از سطح برگ جدا و با یک قطره بافرفسفات بین دو لام با سطح زیر له و عصاره حاصل با استفاده از پودر کابوراندم مجدداً روی سلمک و باقالا مایه‌زنی شد (Walkey 1985).

۴- بررسی خواص فیزیکوشیمیایی

به منظور تعیین درجه حرارت بی‌اشر شدن^۱، تعیین آخرین حد رقت^۲ و تعیین پایداری ویروس در محیط غیره زنده^۳ از برگ‌های چندرقند و توتون آلوده به ویروس به همراه بافرفسفات $0.1\text{ مولار} = 7/2$

در کالیفرنیای آمریکا (Whitney & Duffus 1986) فوجی ساوا و همکاران (Fujisawa et al. 1980) از مزارع چندرقند هوکایدو در ژاپن و همتی و علیزاده (۱۳۴۹) از مزارع چندرقند فارس گزارش شده است.

مواد و روش‌ها

۱- نمونه‌برداری

از بوته‌های دارای علائم موزائیک مزارع چندرقند کاری کمال آباد، هشتگرد، مشکین آباد، اشتهراد و ساووجبلاغ جمعاً ۴۲۷ نمونه جمع‌آوری شد (جدول ۱). نمونه‌برداری در طول، عرض و دو قطر مزارع انجام گرفت. نمونه‌ها درون کیسه‌های پلاستیکی منفرد و در مجاورت یخ به گلخانه منتقل و در فریزر با دمای -20 درجه سانتیگراد نگهداری شد.

۲- دامنه میزانی

هر نمونه جمع‌آوری شده را با کمک بافر فسفات $0.1\text{ مولار} = 7/2\text{ pH}$ به نسبت یک گرم برگ و یک میلی‌لیتر بافر در هاون چینی استریل در مجاورت یخ عصاره‌گیری و شیره حاصل روی برگ گیاهان محک از جمله: تاج خروس *Amaranthus*، سلمک *Beta vulgaris caudatus*، چندرقند *Chenopodium amaranticolor*، خیار *Gomphrena*، گل تکمه‌ای *Cucumis sativus*، توتون *Nicotiana glutinosa*، لوپیا *globosa*

برای تعیین مدت زمان لازم جهت اخذ ویروس توسط شته از گیاه آلوده، تعدادی از شته‌ها را به مدت دو ساعت درون پتری در تاریکی گرسنگی داده و سپس با استفاده از قلم مو تعداد ۶۰ عدد شته به طور تصادفی انتخاب و به مدت یک، پنج و ۱۰ دقیقه از گیاهان آلوده تغذیه و سپس روی بوته‌های سالم قرار داده و پس از ۱۰ دقیقه با استفاده از حشره‌کش مالاتیون بوته‌ها سمپاشی شدند.

۶- روش‌های سروولوژی

به منظور شناسایی ویروس‌های جداسده از روش سروولوژیک نشت مقابل در آگار استفاده شد (Hampton et al. 1990). محیط کاربردی شامل: آگارز ۷۵٪ درصد، سدیم کلراید ۸۵٪ درصد و سدیم آزاد ۴٪ درصد بود و برای شکستن پیکره‌های ویروس موزائیک چندرقند به میزان ۱٪ درصد از سدیم دودسیل سولفات^۱ (SDS) در آب مقطر استفاده گردید که بعداز صاف کردن عصاره حاوی ویروس به آن اضافه و به مدت ۱۰ دقیقه در آب در حال جوش حرارت داده شد (Purcifull and Bachelor 1977).

تمامی نمونه‌های جمع‌آوری شده در مقابل آنتی سرم‌های CMV و AMV موجود در گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی کرج، آنتی سرم CMV اهدائی دکتر اسمیت (Smith) از کانادا و آنتی سرم (BMV) اهدائی دکتر کونیک (Koenic)

pH به نسبت یک گرم برگ به یک میلی‌لیتر با فر عصاره‌گیری شد، پس از صاف کردن عصاره‌ها، برای هر جدایه ویروس نه لوله آزمایش به قطر پنج میلی‌متر انتخاب و در هر لوله یک میلی‌لیتر عصاره ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه در حرارت‌های ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ درجه سانتیگراد در حمام ماری نگهداری و پس از سردنمودن آنها توسط مخلوط یخ و آب به ترتیب روی گیاه سلمک و لوبيا چشم بلبلی در چهار تکرار مایه‌زنی شد (Walkley 1985).

۵- انتقال بوسیله شته

از شته سبز هلو (*M. persicae* Sulz.) به دلیل تحرک زیاد و قدرت بالا در انتقال اکثر ویروس‌های گیاهی در چندرقند (همتی ۱۳۴۸ و Sylvester 1952) و سهولت تکثیر و پرورش آن در شرایط گلخانه استفاده شد. برای اطمینان از عاری بودن شته‌ها از هر گونه آلودگی ویروسی از روش ایجاد کلنی تک شته ماده بالغ را روی گیاه فلفل پرورش داده و در گلخانه از دوبار پاساژ استفاده شد. به این ترتیب پس از استقرار شته روی گیاه فلفل سالم آن را در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و روشنائی مداوم (به منظور جلوگیری از بالدار شدن) در زیر قفس‌های توری دار نگهداری و بعد از یک هفت‌های تشکیل یافته یک شته بالغ انتخاب و برای تکثیر روی بوته سالم دیگر قرار گرفت (Sylvester 1952).

1. Sodium dodecyl sulphate

عبور داده و به مدت ۲۰ ثانیه با آب مقطر شسته و با استات اورانیوم دو درصد به مدت ۱۰ دقیقه رنگ‌آمیزی و توسط میکروسکپ الکترونی مشاهده شد (Hampton et al. 1990)

از آلمان و دکتر فوجی ساوا (Fujisawa) از ژاپن آزمایش گردیدند.

- نمونه‌های جمع‌آوری شده از مزارع مختلف چغدرکاری کرج علائم موزائیک را به صورت‌های زیر نشان دادند.
- ۱- موزائیک شدید همراه با پیچیدگی برگ‌های جوان مرکزی. این تیپ علائم به فراوانی در تمام مزارع چغدرکاری مشاهده شد (شکل ۱).
- ۲- وجود حلقه‌های منظم یا نامنظم زردنگ با مرکزیت سبز به صورت منفرد در برگ‌های مسن در اوایل فصل. این علائم در برگ‌های جوان به صورت موزائیک مشاهده گردید (شکل ۲).
- ۳- زردی ملایم در قسمتی از برگ گیاه که این علائم با مسن شدن بوته به تدریج محو می‌گردید (شکل ۳).

انتقال مکانیکی

با مایه‌زنی عصاره نمونه‌های آلوده به گیاهان آزمون (جدول ۲) وجود دو ویروس BMV و CMV که با نتایج به دست آمده توسط راسل (Francki et al. 1991) و فرانکی (Russell 1979) مطابقت داشت محرز گردید. تمام جایه‌های ویروس موزائیک چغدرقند روی گیاه سلمک پس از

۷- مشاهدات الکترون میکروسکوپی

۱-۷- روش تماس مستقیم مقاطع بریده برگ (Leaf Dip)

به همین منظور قطعه‌ای از برگ آلوده به ویروس موزائیک چغدرقند را با گوشه‌های تیز بریده و نوک هر رأس‌چندین بار از درون رنگ فسفوتینگستیک دو درصد موجود روی پولک مسی دارای پوشش فرموار ۰/۵ درصد عبور داده شد، بعد از ۳۰-۴۰ ثانیه رنگ اضافه با قرار دادن کاغذ صافی در لبه پولک خارج گردید و پس از خشک شدن، نمونه‌ها توسط (Siemens, Elminscop) میکروسکپ الکترونی مشاهده شد (Langenberg 1974).

۲- تلفیق الکترون میکروسکوپی - سرولوزی (ISEM)

در این روش ابتدا پولک‌های نیکلی را به مدت ۳۰ دقیقه روی یک قطره آنتی‌سرم رقیق شده قرار داده، سپس پولک‌های مزبور به ترتیب از درون ۱۰ قطره بافترتریس عبور داده شد تا آنتی‌سرم‌های اضافی روی پولک شسته شود. سپس پولک‌ها روی قطراتی از عصاره گیاهان آلوده قرار گرفته و به مدت چهار ساعت در یخچال نگهداری شد. پس از سپری شدن این مدت پولک‌ها را از درون سه قطره بافترتریس

سرولوژی

تمامی جدایه‌های ویروس موزائیک چندر در مقابل آنتی سرمهای مربوطه در ژل آگارز به همراه سدیم دودسیل سولفات واکنش مثبت نشان دادند، به طوری که از مجموعه ۴۲۷ نمونه تعداد ۴۱۴ نمونه (۹۷٪) آلوده به ویروس موزائیک چندرقند بود و تنها ۱۳ نمونه آلودگی به ویروس موزائیک خیار را نشان دادند. هیچکدام از نمونه‌ها در مقابل آنتی سرم مربوط به ویروس موزائیک یونجه (AMV) واکنش مثبت نشان ندادند، استفاده از سدیم دودسیل سولفات در عصاره‌های گیاهی و سپس حرارت دادن آن به مدت ۱۰ دقیقه در آب در حال جوش در مقایسه با اضافه کردن آن به ژل آگارز بهتر بود زیرا علاوه بر شفافیت بهتر واکنش، حلقه رسوبی مربوط به آن در ژل دیده نشد.

گذشت هفت تا هشت روز در روی برگ‌های مایه‌زنی شده لکه‌های موضعی کرم رنگ به قطر دو تا سه میلی‌متر ایجاد نمود و برگ‌های انتهایی پژمرده و خشک شدند، در صورتی که جدایه‌های مربوط به ویروس CMV در همین گیاه پس از دو تا سه روز لکه‌های موضعی زردرنگ به قطر ۵/۰ میلی‌متر در برگ‌های مایه‌زنی شده ایجاد کرد. جدایه‌های ویروس CMV روی لوبيا چشم بلبلی پس از ۴۸ ساعت لکه‌های موضعی ارغوانی رنگ به قطر ۱/۵ میلی‌متر ظاهر نمود. به همین دلیل از این گیاه برای ریدابی CMV در نمونه‌های چندرقند استفاده شد. مناسب‌ترین گیاه برای تکثیر ویروس BMV، چندربرگی *B.vulgaris* cv. *cicla* و برای ویروس *N.glutinosa*، توتوون CMV و گل تکمه‌ای *Gomphrena globosa* بود.

بررسی‌های الکترون میکروسکپی

عصاره‌های برگ چندرقند حاوی ویروس Leaf (BMV) توسط میکروسکپ الکترونی به روش Dip و به داماندازی توسط آنتی سرم (ISEM) بررسی شدند. پیکره‌های ویروس موزائیک چندرقند به صورت رشته‌های خمش‌پذیر به طول ۷۴۰-۷۲۰ نانومتر بود (شکل ۴). پیکره‌های موجود در عصاره آلوده به ویروس موزائیک خیار در تصویر میکروسکپ الکترونی به صورت چندوجهی به قطر ۳۶-۲۶ نانومتر مشاهده گردید (شکل ۵).

انتقال توسط شته

نتایج به دست آمده نشان داد که حداقل انتقال هر دو ویروس توسط شته سبز هلو (*M.persicae Sulz*) زمانی است که شته‌های گرسنه از بوته‌های آلوده به مدت یک دقیقه تغذیه نمایند (جدول ۳)، این زمان از سایر مدت زمان‌های تغذیه (۵ و ۱۰ دقیقه) برای اخذ ویروس بیشتر بود به طوری که پس از ۱۰ دقیقه تغذیه شته از بوته آلوده انتقال ویروس به گیاه سالم صورت نگرفت.

خواص فیریکی

درجه حرارت غیرفعال شدن برای جدایه‌های ویروس BMV بعد از ۱۰ دقیقه برابر با ۵۵ درجه سانتیگراد و برای جدایه‌های ویروس CMV در همان زمان برابر با ۶۰ درجه سانتیگراد بود، آخرین حد رقتی که جدایه‌های مورد مطالعه به ترتیب روی بوته‌های سلمک و لوپیا چشم بلبلی لکه‌های موضعی ایجاد نمودند برابر با $10^{\circ} - 10^{\circ}$ و پایداری ویروس در محیط غیرزنده در جدایه‌های مربوط به ویروس BMV در عصاره آلوهه چندرقند در شرایط آزمایشگاه ۴۸ ساعت و برای جدایه‌های ویروس CMV با همان شرایط ۲۴ ساعت تعیین گردید.

بحث

در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید پراکندگی ویروس موزائیک چندرقند در مزارع مورد بررسی در سطح وسیعی وجود دارد (جدول ۱). این وضعیت شاید به دلیل سهولت انتقال ویروس موزائیک چندرقند توسط شته‌های ناقل خصوصاً شته سبز هلو با راندمان بالا باشد. پراکندگی ویروس موزائیک خیار (CMV) در مزارع چندرقند کرج بسیار محدود بوده و تنها در اوایل فصل از دو منطقه کمال آباد و شهریار جدا گردید، هرچند با رشد بوته‌های آلوهه علائم در آنها محو و ویروس به سختی از گیاه آلوهه جدا می‌شود. در عین حال نکته قابل توجه این است، در مناطقی که چندرقند جهت تولید بذر کشت می‌گردد منبع اولیه آلوهگی برای ویروس CMV است تا روی سایر

تشکر و قدردانی

اجرای این تحقیق با بهره‌گیری از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران میسر گردیده است که بدینوسیله نگارندهان مقاله از مقامات محترم معاونت‌های پژوهشی دانشگاه و دانشکده کشاورزی و اعضاء شورای تحقیقاتی دانشگاه تهران سپاسگزاری می‌نمایند.

گیاهان میزبان انتشار یابد، این موضوع در ژاپن (Fujisawa et al. 1980) مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است. با توجه به اینکه حداقل پرواز و انبوهی شته‌های بالدار سبز هلو در منطقه کرج در نیمه دوم خدادادماه گزارش شده است (همتی ۱۳۴۸)، مناسب‌ترین زمان کاشت این محصول در نیمه اول خدادادماه در منطقه کرج می‌باشد که گیاه در اوایل رشد از آلوهه شدن توسط شته‌های بالدار مصون بماند. وجود گیاهانی از قبیل: چندرقند، اسفناج و علفهای هرز مانند تاج خروس و شیر تیغک در دوره‌ای هر چند کوتاه پس از برداشت چندرقند موجب انتشار ویروس موزائیک چندرقند و ویروس‌های عامل زردی خواهد شد، براساس گزارش تیکل و پرسلی (Teakle & Persley 1974) عدم وجود چنین گیاهانی در فاصله زمانی دی (دسامبر) تا اسفند (فوریه) موجب ناپدید شدن ویروس موزائیک چندرقند در مزارع چندرقند منطقه کوئیزلند استرالیا شده است.

جدول ۱- پراکندگی و درصد فراوانی ویروس‌های BMV و CMV در مناطق مختلف

Table 1 Distribution and frequency percentage of BMV and CMV in various regions

محل Area	تعداد نمونه No.of specimen	تعداد نمونه آلوده No. of infected specimen		درصد آلودگی % infection	
		BMV	CMV	BMV	CMV
(کمال آباد) Kamalabad	175	167	8	95.4	4.6
(هشتگرد) Hashtgerd	62	62	0	100	0
(شهریار) Shahryar	91	86	5	94.5	4.5
(مشکین آباد) Meshkinabad	42	42	0	100	0
(ساوجبلاغ) Savojbolaq	57	57	0	100	0

جدول ۲- علائم ایجاد شده توسط ویروس‌های BMV و CMV در گیاهان مختلف آزمون

Table 2 Symptoms induced by BMV and CMV in various test plants

گیاهان آزمون Test plant	BMV	ویروس موزائیک چندرقدن WV	ویروس موزائیک خیار CMV
تاج خروس Amaranthus caudatus	NLL, SY		CLL
چندرقدن Beta vulgaris	SY, SM		SY, MM
سلمک Chenopodium amaranticolor	NLL, W		NLL
خیار Cucumis sativum	0		SY,SM
گل تکمه‌ای Gomphrena globosa	NLL		SY,D
توتون Nicotiana glutinosa	0		SY,SM,D
لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata	0		NLL
باقلاء Vicia fabae cv. Algeria	0		NLL

SY: Systemic

D: Defoliation

SM: Severe mosaic

O: Symptomless

MM: Mild mosaic

CLL: Chloretic local lesion

W: Wilting

NLL: Necrotic local lesion

جدول ۳- درصد انتقال ویروسهای BMV و CMV توسط شته سبز هلو در زمان‌های مختلف تغذیه

Table3 Transmission of BMV and CMV viruses by green peach Aphid in various feeding periods

زمان تغذیه (دقیقه) feeding period (min)	تعداد بوته No.plant	تعداد بوته آلوده No.of infected plant		درصد انتقال transmission(%)	
		BMV	CMV	BMV	CMV
1	60	32	7	53.3	11.7
5	60	8	3	13.4	5
10	60	0	0	0	0



شکل ۱- برگ چندرقند با علائم موزائیک در اثر آلودگی به ویروس موزائیک چندر

Fig.1 Sugar beet leaf showing mosaic symptom caused by beet mosaic virus




شکل ۲- دایردهای زردنگ ایجاد شده در برگ چغندر قند در اثر آلودگی به ویروس موزائیک چغندر

Fig.2 Chloretic rings in sugar beet leaf caused by beet mosaic virus




شکل ۳- زردی و بدشکلی برگ چغندر قند در اثر آلودگی به ویروس موزائیک خیار.

Fig.3 Yellowing and molformation in sugarbeet leaf caused by cucumber mosaic virus



شکل ۴- عکس الکترون میکروسکوپی از پیکره ویروس موزائیک چندر
Fig.4 Electron micrograph of beet mosaic virus particle



شکل ۵- عکس الکترون میکروسکوپی از پیکره ویروس موزائیک خیار با روش ISEM
Fig.5 Electron micrograph of cucumber mosaic virus by ISEM method

منابع مورد استفاده

References

- آمارنامه کشاورزی ۱۳۷۸. معاویت برنامه‌ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی. ۱۸۵ صفحه
- رضائیان، م.ع. ۱۳۴۸ . بیماری ویروس موزائیک چندرقند. پایان نامه فوق لیسانس، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. ۸۶ صفحه
- علیزاده، ج. ۱۳۴۹. بررسی خسارت ویروس موزائیک چندرقند. گزارش سالیانه طرح بررسی بیماری‌های مهم نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. ۱۱۴ صفحه
- همتی، ک. ک. ۱۳۴۸. نقش شته‌های سبزه‌لو و سیاه باقالا در انتقال بیماری‌های ویروس موزائیک و زردی چندرقند. گزارش سالیانه طرح بررسی بیماری‌های مهم نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. ۸۶ صفحه
- همتی، ک. ک. و علیزاده، ج. ۱۳۴۹. میزان جدید ویروس موزائیک خیار در ایران. نشریه جمیعت کارشناسان بیماری‌های گیاهی ایران، جلد ششم، صفحه ۱۰۱-۱۰۶
- Bennet CW (1949) Some unreported host plants of beet mosaic virus. *Phytopathology* 39:669-672
- Fujisawa I, Sugimoto T, Tsuchizaki T (1980) Cucumber mosaic Virus and beet mosaic virus isolated from sugar beets in Hokkaido. *Res Bull Hokkaido Nat 1 Agric Exp. Stn.* 125:77-84
- Francki RIB, Mossop DW, Hatta T (1979) Cucumber mosaic virus. No 213. CMI/AAB. Description of plant viruses 6pp
- Hampton R, Ball E, Boer D (1990) Serological methods for detection and identification of viral and bacterial plant pathogens. APS Press. Minnesota USA, 389pp
- Langenberg WG (1974) Leaf-dip serology for determination of strain of elongated plant virus, *Phytopathology* 64:128-131
- Mukhopadhyay AN (1987) Hand book on diseases of sugarbeet Vol 2 CRC Press 177pp
- Porth,A, Lesemden DE, Vetten HJ (1987) Characterization of Poty Virus isolates from West African Yams J Phytopath. 120:166-183
- Purcifull DE, Bachelor DH (1977) Immunodiffusion tests with sodium dodecyl sulphat, treated plant viruses.Bull. No 788, Agr Exp Stn Univ Florida,39pp

- Russell GE(1971) Beet mosaic virus No 53 CMI./AAB Description of plant viruses 4pp
- Shepherd RJ, Hall DH, Purcifull DE (1965) Occurrence of the alfalfa mosaic virus in sugar beet in California, J Am Soc.Sugar Beet Technol 13:374-377
- Smith KM (1972) A text book of plant Virus diseases. 3th. ed. Longman Press 684pp
- Sylvester ES (1952) Comparative transmission of beet mosaic virus by four aphid species. Phytopathology 42:252-254
- Teakle DS, Persley DM(1974) Appearance and disappearance of beet mosaic virus in Queensland. Australian plant pathology Soc 3:59-60
- Walkey DGA (1985) Applied plant Virology 7th ed Redwood Burn Ltd 329 pp
- Whitney ED, Duffus JE (1986) Compendium of beet Diseases and Insects. The American phytopathology society Press 76pp