

قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‌هایی با ساختار ژنتیکی وسعی به رگه‌های چغندرقد

The possibility of transferring of rhizomania resistance genes from genetically broad based populations and varieties into sugar beet lines

حسنعلی شهبازی^۱، سید یعقوب صادقیان مطهر^{۲*}، مسعود احمدی^۳ و جمشید سلطانی^۱

تاریخ دریافت: ۸۸/۱/۲۲؛ تاریخ پذیرش: ۸۸/۱۲/۹

ح. شهبازی، س. ی. صادقیان، م. احمدی و ج. سلطانی. ۱۳۸۹. قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‌هایی با ساختار ژنتیکی وسعی به رگه‌های چغندرقد. مجله چغندرقد ۲۶(۱) ۳۰-۱۵.

چکیده

به منظور انتقال مقاومت به بیماری ریزومانیا از ارقام تجاری به رگه‌های چغندرقد، در سال ۱۳۸۶ تلاقی بین ۱۱ رقم تجاری مقاوم به بیماری‌های مهم چغندرقد به عنوان والد گرده‌افشان با بوته‌های نرعقیم موجود در دو لاین تیپ ۰ دارای ژن‌های خودباروری (۲۳۱ و ۲۶۱) به عنوان والد مادری انجام شده و تعداد ۲۹۹ تک بوته هیبرید برداشت گردید. والدهای پدری و مادری براساس تعداد تک بوته هیبرید تولید شده در داخل ایزوله با یکدیگر مقایسه شدند. هیبریدهای تولید شده در شرایط مزرعه آلوود به ریزومانیا از نظر شاخص زردی برگ‌ها و درصد آلوودگی به بیماری ریزومانیا ارزیابی شدند. بین تعداد تک بوته هیبرید برداشت شده از والدین مادری، اختلاف زیادی وجود نداشت. والد مادری ۲۶۱ با ۴۴/۲ درصد، تعداد هیبرید بیشتری را در مقایسه با والد مادری ۲۳۱ با ۴۵/۸ درصد، دارا بود. ولی والدین گرده‌افشان‌ها از نظر تعداد تک بوته هیبرید برداشت شده با یکدیگر اختلاف زیادی داشتند. تک بوته‌های برداشت شده همچنین از نظر تعداد هیبرید مقاوم تولید شده نیز مقایسه شدند. بین تعداد هیبرید مقاوم حاصل از والدین مادری اختلاف زیادی وجود نداشت، اما والدین گرده‌افشان‌ها از نظر تعداد هیبرید مقاوم به دست آمده از آن‌ها با یکدیگر اختلاف زیادی داشتند، به طوری که بیشترین تعداد هیبرید مقاوم براساس نمره زردی برگ مربوط به نتاج حاصل از والد گرده‌افشان رقم شماره هفت به میزان ۸۰/۸ درصد و کمترین تعداد هیبرید مقاوم بر این اساس مربوط به نتاج حاصل از والد گرده‌افشان شماره هشت با صفر درصد بود. بالاترین تعداد هیبرید مقاوم بر اساس درصد آلوودگی به ریزومانیا در ریشه (۵۷/۷۰ درصد) به هیبریدهای حاصل از والد گرده‌افشان شماره هفت و کمترین تعداد هیبرید مربوط به نتاج حاصل از والدهای گرده‌افشان دو، هشت، نه و ۱۱ بود. تعداد هیبریدهایی که از والدهای گرده‌افشان یک، سه، چهار، پنج، شش، هفت و ۱۰ به دست آمدند، نیز قابل توجه بود. بنابراین، این هیبریدها در تلاقی با رگه‌های تیپ ۰ پتانسیل بیشتری را در تولید نسل‌های در حال تفکیک برای انتقال ژن‌های مقاوم خواهند داشت. بین تک بوته‌های هیبرید برداشت شده والدین مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ از نظر نمره زردی برگ‌ها و شاخص بیماری ریزومانیا اختلاف زیادی مشاهده نشد ولی اختلاف آن‌ها با شاهدهای مقاوم و متholm در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. اما بین ۱۱ والد گرده‌افشان از نظر نمره زردی برگ‌ها و درصد آلوودگی به بیماری ریزومانیا اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد وجود داشت، به طوری که کمترین نمره زردی برگ‌ها و درصد آلوودگی به ریزومانیا در بین گرده‌افشان‌ها مربوط به رقم شماره هفت و بیشترین آن مربوط به رقم‌های شماره هشت و نه بود.

واژه‌های کلیدی: انتقال مقاومت، توده، هیبرید، چغندرقد، رگه، ریزومانیا، شاخص آلوودگی، لاین

۱- مریبی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

۲- استاد مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال- کرج *نویسنده مسئول

۳- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

بیماری در ریشه‌های فرعی و جلوگیری از حرکت آن به داخل ریشه اصلی، موجب کاهش مایه تلخیج اولیه و خسارت حاصل از آن می‌شوند (Asher et al. 2002). اولین کوشش‌ها به منظور دستیابی به مقاومت علیه بیماری، براساس عالیم ایجاد شده در رگه‌ها یا رقم‌هایی که در مزرعه آلووده به ریزومانیا کشت می‌شدند و در زمان برداشت کمترین عالیم و خسارت ناشی از بیماری را نشان می‌دادند، شروع شد (Lewellen et al. 1987; Scholten et al. 1996). اولین منبع مقاوم به ریزومانیا در آمریکا پیدا شد. ژرمپلاسم مقاوم دارای یک ژن مقاوم به نام Rz1 بود که به ژن Holly شهرت یافت. این ژن مقاومت نسبی را از طریق جلوگیری از تکثیر ویروس به عمل می‌آورد. اولین رقم تجاری مقاوم حامل این ژن در ایتالیا به نام Rizor تهییه شد (Scholten and Lange 2000). با توجه به مقاومت موجود در رقم‌های زراعی چندرقند که توسط یک ژن غالب کنترل می‌شود و سهولت نسبی واردکردن این ژن به سایر مواد اصلاحی، امروزه از این منبع به طور گستردگی در برنامه بهنژادی (Biancardi et al. 2002) چندرقند استفاده می‌شود؛ Steddom et al. 2003). به هر حال این ژن در شرایط آلوودگی شدید بیماری توانائی ایجاد مقاومت در گیاه را ندارد (Lewellen 1995). علاوه بر آن در *Beta vulgaris* ssp *maritima* گونه‌های وحشی همچون Wb41 و Wb42 منابع مقاومت Rz2 و Rz3 بودند. پیدا شدن (Lewellen et al. 1987; Scholten and Lange

مقدمه

بیماری ریزومانیا یکی از مهم‌ترین بیماری‌های چندرقند در دنیاست. در سال ۱۹۵۸، ویروس عامل بیماری به نام ویروس زردی نکروتیک رگبرگ Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) در ایتالیا به عنوان عامل اصلی کاهش دهنده شدید عملکرد ریشه و عملکرد شکر در چندرقند شناسایی شد. این بیماری به واسطه علائم موجود روی ریشه چندرقند به نام بیماری ریزومانیا نام‌گذاری شد. این بیماری در اکثر نقاط چندرقند کاری دنیا به خصوص در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا-گسترش یافته است (Asher et al. 2003; Nielsen et al. 2001) ویروس به تنها ی قادر به ایجاد بیماری روی چندرقند نبوده و در خاک مزرعه توسط قارچ پارازیت اجباری Polymixa beta keskin (Tamada 1975) در رقم‌های حساس بستگی فراوان به حضور و تراکم قارچ ناقل ویروس دارد (Tuitert 1990). اما خود قارچ نقشی در کاهش رشد ریشه چندرقند ندارد (Rush 2003). علاوه بر وجود قارچ ناقل و ویروس همراه آن در خاک، عوامل دیگری از جمله رطوبت و دمای خاک نقش مهمی در شدت عالیم بیماری دارند (Tuitert 1990). خسارت این بیماری معمولاً بیش از ۳۰ درصد و در مواردی به صد درصد نیز رسیده است (Asher 1993). این بیماری با کشت رقم‌های مقاوم یا (Pferdmenges et al., 2008) متحمل قابل کنترل است. رقم‌های مقاوم با کاهش تکثیر ویروس عامل

اصفهان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، سمنان و لرستان گزارش شده است (ایزدپناه و همکاران ۱۳۷۵؛ دارابی ۱۳۷۷، جعفرپور و همکاران ۱۳۷۹ و توده‌فلح و همکاران ۱۳۷۹). با توجه به روند رو به گسترش بیماری ریزومانیا در کشور و تأثیر مخربی که این بیماری بر عملکرد چندرقند دارد، تهیه و تولید رقم‌های مقاوم نسبت به این بیماری مورد توجه بهنژادگران قرار گرفت. اگرچه با استفاده از ژن Holly یک رقم تجاری مقاوم به ریزومانیا در داخل کشور تهیه شده است، اما از آنجایی که مقاومت به این بیماری پایدار نیست، نیاز به تهیه رقم‌های متعدد با منابع متفاوت مقاومت بالا و یا مقاومت چندگانه به ریزومانیا و ریزوکتونیا است. برای تهیه چنین رقم‌های تجاری، به پایه مادری و پدری مقاوم حامل ژن‌های مختلف و یا رگه‌های والدینی که هر کدام به یک یا دو بیماری فوق‌الذکر مقاوم باشند، نیاز است.

در این تحقیق، به منظور کوتاه کردن دوره بهنژادی رقم‌های مقاوم، از رقم‌های تجاری هیرید مقاوم به بیماری‌های مهم ریزومانیا و ریزوکتونیا به عنوان والد گردددهنده در تلاقی با رگه‌های تیپ O حساس استفاده شد. از ارزیابی نتاج حاصل به همراه رقم‌های تجاری مقاوم در شرایط آلووده، بهترین دورگ‌ها از نظر والد گرددهافشان و رگه مادری مشخص و پتانسیل نسل‌های F1 برای تهیه نسل‌های در حال تفکیک و رگه‌های خالص مقاوم به بیماری ریزومانیا مشخص شد.

2000; Gidner et al. 2005) در ضمن ژن Rz4 در همان مکان Rz1 و Rz5 (از منبع WB258) بر روی (Grimmer et al. 2008). به نظر می‌رسد این سه ژن در واقع آلل‌های مشابه در یک مکان ژنی هستند (Lein et al. 2007). هم‌گرایی جایگاه‌های ژنی مقاومت به ریزومانیا بر روی کروموزوم شماره سه برای بهنژادگران محدودیت‌هایی از نظر ترکیب آلل‌های مقاوم از منابع مختلف در یک ژنتیپ، ایجاد می‌کند (Graham et al. 2009). این ژن‌ها نسبت به ژن قبلی سطوح بالایی، مقاومت به بیماری را نشان دادند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد رقم‌هایی که از تلاقی چندرقند با گونه‌های وحشی حاصل شده‌اند و دارای ژن‌های مقاوم Rz1 با Rz2 یا Rz3 بودند، نسبت به رقم‌هایی که فقط ژن Rz1 را داشتند، مقاومت بیشتری داشتند (Gidner et al. 2005).

در آمریکا، هیریدهای حامل ژن Rz1 در تعدادی از مزارع آلووده، عالیم بیماری ریزومانیا را بروز دادند. این مسئله، تغییر ژنتیکی ویروس و غلبه بر ژن مقاومت را تأیید کرد (Rush et al. 2006). در سال ۲۰۰۶، دو والد گرددهافشان مقاوم به ریزومانیا به نام‌های FC220 و FC221 در آمریکا تهیه شد که علاوه بر مقاومت به ریزومانیا به سایر بیماری‌ها از جمله ریزوکتونیا نیز مقاومت نشان دادند (Panella et al. 2008).

اولین بار در ایران، ریزومانیا توسط ایزدپناه و همکاران (۱۳۷۵) از شیراز گزارش شد و تاکنون از اکثر نقاط چندرکاری کشور از جمله خراسان، فارس،

ایزوله کشت شدند. برای جلوگیری از تداخل بوته‌ها بین هر کدام از والدهای مادری و پدری یک خط نکاشت منظور شد. فاصله ریشه‌ها روی خط ۵۰ سانتی‌متر بود. قطعات ایزوله بهوسیله چادر بزرزتی با فاصله یک متر از هم جدا شدند و ارتفاع چادرها ۲/۵ متر بود. ردیف‌های کاشت عمود بر جهت وزش باد در نظر گرفته شدند. در زمان گردهافشانی، در داخل هر اوتایپ بوته‌های گرده‌دهنده حذف و بوته‌های نرعقیم ژنتیکی به عنوان والد مادری حفظ شدند. در طول فصل رشد، مراقبت‌های زراعی لازم شامل آبیاری و کنترل علف‌های هرز و مبارزه با آفات انجام گرفت. در اواسط تیر هنگام رسیدن بذر، اقدام به گردآوری بذر شد. برداشت بذر طی چند مرحله و با توجه به رسیدن بذرهای هر بوته انجام شد. بذرهای هر تک بوته والد مادری به صورت جداگانه برداشت و شماره‌گذاری شد. به طور کلی از میان تمام تلاقی‌ها، تعداد ۲۹۹ تک بوته نرعقیم، تولید بذر هیبرید توده بذرهای هر تک بوته هیبرید جداگانه برداشت و بوخاری شدند.

در بهار سال ۱۳۸۷، جهت بررسی مقاومت هیبریدهای F1 به بیماری ریزومانیا، هیبریدهای تک بوته به صورت جداگانه در یک خط به طول هفت متر با فاصله ردیف ۵۰ سانتی‌متر در مزرعه آلوده به بیماری ریزومانیا (Hot spot) واقع در کارخانه قند جام کشت شد. بوته‌ها با فاصله ۱۸ سانتی‌متر تنک و در طول فصل رشد هیبریدها از نظر رشد رویشی و زردی برگ‌ها یادداشت برداری شدند.

مواد و روش‌ها

به منظور انتقال ژن‌های مطلوب و مقاوم به بیماری‌های مهم چند رقند- بهویژه بیماری ریزومانیا- از رقم‌های تجاری مقاوم به رگه‌های پیشرفته اوتایپ از دو رگه ۲۶۱ و ۲۳۱ به عنوان والد مادری استفاده شد. در بهار سال ۱۳۸۵، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تعداد ۱۱ رقم دیپلوبید دارای ژن‌های مقاوم به ریزومانیا، ریزوکتونیا و نماتد به عنوان والد گردهافشان با بوته‌های نرعقیم ژنتیکی موجود در داخل دو رگه تیپ O مذکور جهت تلاقی در سال ۱۳۸۶ در نظر گرفته شدند و در سال ۱۳۸۷ نتاج حاصل در قطعه زمین آلوده به ریزومانیا کشت شدند. ویژگی‌های رقم‌های تجاری مورد استفاده در این تحقیق در جدول یک آمده است.

در پاییز سال ۱۳۸۵، ریشه‌های سالم و خوش‌فرم رقم‌های تجاری که در مزرعه آلوده به بیماری ریزومانیا کشت شده بود، انتخاب و برای بهاره شدن در زمستان سیلو شدند. از دو لاین اوتایپ ۲۳۱ و ۲۶۱ نیز اشتکلینگ تهیه و به همراه ریشه‌های گردهافشان‌ها برداشت و سیلو شدند. در بهار سال ۱۳۸۶، در شرایط ایزوله دورگ‌گیری انجام شد. در هر ایزوله، در داخل هر چادر، تعداد ۱۴ خط با فاصله عرضی ۵۰ سانتی‌متر و به طول شش متر در نظر گرفته شد که پنج خط (سه خط سمت راست و دو خط سمت چپ داخل ایزوله) از والد گردهافشان (رقم تجاری مقاوم) و سه خط از تیپ O از رگه ۲۳۱ و سه خط دیگر از تیپ O از رگه ۲۶۱ به عنوان والدهای مادری در وسط

نمره صفر=برگ‌های سبز تیره، نمره یک=برگ‌های سبز، نمره دو=برگ‌های سبز روشن، نمره سه=برگ‌های غالباً زرد و نمره چهار=برگ‌های کاملاً زرد یکنواخت.

زردی ناشی از بیماری ریزومانیا بر روی برگ‌ها در هر خط بر اساس مقیاس پنج گانه پانلا (Panella et al. 2008) به شرح ذیل گروه‌بندی شدند:

جدول ۱ خصوصیات رقم‌های تجاری گردهافشان مورد استفاده در تلاقی

شماره ردیف رقم تجاری	خصوصیات وینه رقم تجاری	رتبه مقاومت رقم تجاری
۱	مقاوم به ریزومانیا و متتحمل به ریزوکتوپیا	۱
۲	مقاوم به ریزومانیا	۲
۲	مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا	۳
۱	مقاوم به ریزومانیا	۴
۱	مقاوم به ریزومانیا	۵
۲	مقاوم به ریزومانیا	۶
۱	مقاوم به ریزومانیا و متتحمل به ریزوکتوپیا	۷
۱	مقاوم به ریزومانیا و متتحمل به ریزوکتوپیا	۸
۱	مقاوم به ریزومانیا و مقاوم به نماتد	۹
۱	مقاوم به ریزومانیا و مقاوم به نماتد	۱۰
۱	مقاوم به ریزومانیا	۱۱

نتایج و بحث

خصوصیات والدهای پدری

والدهای پدری از نظر رنگ اندام‌های هوایی، یکنواختی در گل‌دهی و وضعیت تولید دانه‌گرده در روی هر بوته مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی رقم‌های تجاری، گل‌های پلی‌ژرم تولید کردند. به عبارتی بذرهایی که بر روی والد پدری تولید شدند، دارای دو جوانه یا بیشتر بودند(جدول ۲).

از نظر وضعیت رنگ اندام‌های هوایی، ۱۰ رقم تجاری کاملاً سبز یکنواخت و تنها رقم شماره چهار دارای زردی بیشتری بود. رقم شماره هفت با ۹۵ درصد یکنواختی، بالاترین میزان یکنواختی در گل‌دهی را به خود اختصاص داد و کمترین میزان یکنواختی گل‌دهی مربوط به رقم‌های شماره هفت، نه و پنج بود(جدول ۲).

در هنگام برداشت، تعداد ریشه‌های آلوده و سالم در هر خط، شمارش و درصد آلودگی از تقسیم تعداد ریشه‌های آلوده به کل ریشه‌ها محاسبه شد. هیبریدهایی که آلودگی ریشه آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد بود، در گروه هیبریدهای حساس قرار گرفتند و هیبریدهایی که بوته‌های آن‌ها دارای ریشه سالم و عاری از عالیم ریزومانیا بودند، به عنوان مقاوم انتخاب شدند. در ضمن، وضعیت گرده‌دهی رقم‌های تجاری، یکنواختی والدهای گردهافشان، مقدار بذر تولید شده بر روی هر کدام از تک بوته‌های مادری و تعداد هیبرید مقاوم تولید شده از هر گردهافشان (رقم تجاری) براساس نوع والد مادری (۲۳۱ و ۲۶۱) بررسی و مبنای مقایسه قرار گرفت.

مکمل است. بهر حال، گلدهی و رسیدن همزمان گیاهان یک رگه و یا یک جمعیت در ترکیب پذیری و مقدار تولید بذر نتاج هیبرید مؤثر هستند.

(Sadeghian et al. 1993)

یکنواختی در گلدهی به منزله تشابه نیاز ورنالیزاسیون در تمام بوتهای یک رقم و در نتیجه ظاهر تقریباً یکسان ژن‌های کنترل کننده احتیاج به دمای پایین گیاه قبل از شروع مرحله زایشی و طول روز در فرآیند قبل و بعد از ساقه‌روی است که در واقع دو سیستم ژنتیکی جدا و

جدول ۲ خصوصیات والدهای گردددهنده از نظر میزان زردی، درصد گلدهی و مقدار گردددهی

رقم تجاری	امتیاز گرده دهنده ^b	امتیاز زردی اندام‌های هوایی ^a	یکنواختی در گلدهی (درصد)	امتیاز پنج رنگ کاملاً سبز و امتیاز یک ب کمترین سبزی و بیشترین مقدار زردی برگ را نشان می‌دهد.
۱	۹۰	۵	۲	
۲	۸۰	۵	۱	
۳	۷۵	۵	۵	
۴	۷۰	۴	۴	
۵	۷۰	۲	۲	
۶	۷۵	۱	۱	
۷	۹۵	۵	۵	
۸	۹۰	۳	۳	
۹	۷۰	۱	۱	
۱۰	۸۰	۳	۳	
۱۱	۸۰	۳	۳	

^a = امتیاز پنج رنگ کاملاً سبز و امتیاز یک ب کمترین سبزی و بیشترین مقدار زردی برگ را نشان می‌دهد.
^b = امتیاز پنج بیشترین و یک کمترین مقدار گردددهی را نشان می‌دهد.

تعداد نتاج پایه‌های مادری و پدری

از تلاقی والدهای پدری با بوتهای نر عقیم ژنتیکی موجود در دو رگه اوتایپ در شرایط یکسان، ۲۹۹ نتاج هیبرید به دست آمد. هرچند که تعداد هیبرید از پایه ۲۳۱ معادل ۱۳۵ هیبرید (۵۴/۲ درصد) و از پایه ۲۶۱ برابر ۱۶۱ هیبرید (۴۵/۸ درصد) بود ولی با توجه به آزمون کای اسکور بین دو پایه مادری از نظر تعداد نتاج هیبرید اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در عین حال، بین پایه‌های پدری از نظر تعداد نتاج اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت. این مسئله می‌تواند مربوط به تفاوت درصد نر عقیمی و

به طور کلی وضعیت تولید دانه‌گرده در والدهای پدری در مقایسه با یک والد گردده‌افشان معمولی به صورت محسوسی پائین‌تر بود و رقم‌های مورد استفاده از این نظر، با یکدیگر اختلاف داشتند. در رقم‌های دو، شش و نه، دانه‌گرده بهوضوح مشاهده نشد ولی رقم‌های هفت و سه نسبت به سایر رقم‌های تجاری، دانه‌گرده فراوان‌تری تولید و شاید به همین دلیل، این رقم‌ها بیشترین نتاج هیبرید را تولید کردند (جدول ۲).

افزایش پتانسیل کمی و کیفی لاین‌های نوترکیب بسیار اهمیت دارد (Bosemark 1993). از مجموع ۲۹۶ هیبرید، ۳۱ هیبرید مقاوم بودند که از این تعداد ۱۶ و ۱۵ هیبرید به ترتیب مربوط به والد مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ بود (جدول ۳).

بر اساس مقدار زردی برگ، تعداد ۴۸ هیبرید ۳۲/۵ درصد از کل هیبریدها) از والد مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ (حدود ۱۶ درصد) انتخاب شدند. اما بر اساس درصد آلوگی ریشه که بعد از برداشت انجام شد، حدود ۳۱ درصد کل هیبریدها مقاوم بودند. این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب بر اساس زردی برگ، اگرچه تا حدی ملاک خوبی برای ارزیابی مقاومت است، ولی کافی نیست. در شرایطی که مزرعه آزمایشی بسیار آلوه باشد، در ارزیابی مشاهده‌ای، ژنوتیپ‌های حساس و نسبتاً حساس را می‌توان به‌آسانی تشخیص داد ولی سالم بودن ریشه‌ها از نظر وضعیت آلوگی نیز مشاهده و باید ریشه‌های سالم از آلوه جدا شوند. در عین حال، غریال کردن دقیق ژنوتیپ‌ها از طریق آزمون الیزا یا نشانگر ملکولی به‌همراه اطلاعات زراعی با دقت بیشتری امکان‌پذیر است (Amiri et al. 2003). به‌هر حال، در زمانی که تعداد ژنوتیپ‌ها زیاد هستند، ارزیابی مشاهده‌ای توصیه می‌شود، ولی پس از انتخاب لاین‌ها و تثیت نرعقیمی، ارزیابی لاین‌های مقاوم از طریق نشانگرهای مولکولی و آزمون الیزا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین قابلیت ترکیب‌پذیری بیشتر پایه ۲۶۱ در توانائی تولید بذر هیبرید باشد. بیشترین تعداد هیبرید مربوط به والد مادری ۲۳۱ در تلاقی با والدهای پدری شماره شش و چهار به تعداد ۱۸ هیبرید (شش درصد) و کمترین تعداد مربوط به والد پدری شماره پنج به تعداد شش هیبرید (دو درصد) به‌دست آمد. بیشترین تعداد نتاج هیبرید والد مادری ۲۶۱ با والد پدری شماره دو به تعداد ۲۳ هیبرید (۷/۷ درصد) و کمترین آن با والد پدری هشت به تعداد پنج هیبرید (۱/۷ درصد) حاصل شد (جدول ۳).

در طول فصل رشد، میزان آلوگی هیبریدها به بیماری ریزومانیا در مزرعه براساس سبزینگی برگ‌ها رتبه‌بندی شدند که ۴۸ هیبرید از نظر سبزبودن برگ، امتیاز ممتاز دریافت کردند و ۲۲ هیبرید متعلق به پایه ۲۳۱ و ۲۶ هیبرید مربوط به پایه ۲۶۱ بود. در هنگام برداشت، ریشه‌های هر هیبرید بر اساس علایم بیماری ریزومانیا به صورت مشاهده‌ای مقایسه و هیبریدهایی که بیشتر از ۵۰ درصد بوته‌های آن‌ها آلوگی داشتند در گروه هیبریدهای حساس و در غیر این صورت، در گروه هیبریدهای مقاوم دسته‌بندی شدند. از این هیبریدها می‌توان برای تکوین لاین‌های اوتایپ و نرعقیم مقاوم به بیماری استفاده کرد. ایجاد نسل‌های بک‌کراس از تلاقی بین هیبریدهای F1 مقاوم با ژنوتیپ‌های نرعقیم ژنتیکی و یا ایجاد نسل F2 از طریق خودگشتنی F1 منجر به لاین‌های نوترکیب می‌شود که در این راستا، گزینش دوره‌ای با استفاده از ژن‌های نرعقیم ژنتیکی در

جدول ۳ فراوانی و درصد هیبرید تولید شده از والدهای مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ در تلاقي با والدهای گردهافشان

تعداد کل هیبرید	تولید هیبرید(%)	تعداد هیبرید مقاوم براساس شاخص زردی برگ		درصد هیبرید مقاوم براساس شاخص آلوگی ریشه		درصد هیبرید مقاوم براساس شاخص آلوگی ریشه		منشا هیبرید پایه پدری پایه مادری	
		۱	۳/۶	۱	۳/۶	۱	۳/۶	۱	۱
۲۸	۹/۴	۱	۳/۶	۱	۳/۶	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۲	۴/۰	۱	۳/۶	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۶	۵/۴	۰	۰/۰	۱	۳/۶	۰	۰/۰	۲۶۱	
۳۳	۱۱/۰	۳	۹/۱	۰	۰/۰	۰	۰/۰		۲
۱۰	۳/۳	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۳۱	
۲۳	۷/۷	۳	۹/۱	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۳۰	۱۰/۰	۱۲	۴۰/۰	۸	۲۶/۷	۰	۰/۰		۳
۱۸	۶/۰	۷	۲۶/۳	۴	۱۳/۳	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۲	۴/۰	۵	۱۶/۷	۴	۱۳/۳	۰	۰/۰	۲۶۱	
۲۴	۸/۰	۲	۸/۳	۳	۱۲/۵	۰	۰/۰		۴
۱۲	۴/۰	۲	۸/۳	۲	۸/۳	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۲	۴/۰	۰	۰/۰	۱	۴/۲	۰	۰/۰	۲۶۱	
۱۷	۵/۷	۲	۱۱/۸	۲	۱۱/۸	۰	۰/۰		۵
۶	۲/۰	۱	۵/۹	۱	۵/۹	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۱	۳/۷	۱	۵/۹	۱	۵/۹	۰	۰/۰	۲۶۱	
۳۵	۱۱/۷	۲	۵/۷	۱	۲/۹	۰	۰/۰		۶
۱۸	۶/۰	۱	۲/۹	۱	۲/۹	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۷	۵/۷	۱	۲/۹	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۲۶	۸/۷	۲۱	۸۰/۸	۱۵	۵۷/۷	۰	۰/۰		۷
۱۱	۳/۷	۸	۳۰/۸	۷	۲۶/۹	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۵	۵/۰	۱۳	۵۰/۰	۸	۳۰/۸	۰	۰/۰	۲۶۱	
۱۳	۴/۳	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰		۸
۸	۲/۷	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۳۱	
۵	۱/۷	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۲۷	۹/۰	۲	۷/۴	۱	۳/۷	۰	۰/۰		۹
۱۲	۴/۰	۲	۷/۴	۱	۳/۷	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۵	۵/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۳۳	۱۱/۰	۱	۳/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰		۱۰
۱۵	۵/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۸	۶/۰	۱	۳/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۳۳	۱۱/۰	۲	۶/۱	۰	۰/۰	۰	۰/۰		۱۱
۱۵	۵/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۳۱	
۱۸	۶/۰	۲	۶/۱	۰	۰/۰	۰	۰/۰	۲۶۱	
۲۹۹	۱۰۰	۴۸	۱۶/۰۵	۳۱	۱۰/۳۷	۰	۰/۰	کل	

زرد رنگ نیز وجود داشت ولی گیاهان آلوده به صورت لکه‌های نامنظم در مزرعه پراکنده بودند و رنگ برگ‌ها از سبز روشن تا زرد تغییر می‌کرد (Asher et al. 2002).

لازم به توضیح است که در مشاهدات مزرعه‌ای، هیبریدهایی وجود داشتند که دارای برگ‌های کاملاً سبز ولی ریشه‌های کاملاً آلوده به ریزومانیا بودند. همچنین ریشه‌های کاملاً سالم با برگ‌های تقریباً

نتایج این آزمایش نشان داد که رقم‌های شماره هفت و سه نسبت به سایر رقم‌های تجاری (والدین پدری) مقاومت را به تعداد نتاج بیشتری منتقل کردند. اگرچه تعداد کل هیبریدهای بهدست آمده از رقم شماره هفت و سه کمتر از بعضی رقم‌های دیگر مثل شماره شش بوده است ولی درصد هیبریدهای مقاوم آن‌ها از سایر رقم‌های تجاری بیشتر بود. بر عکس هیبریدهایی که از رقم شماره شش با بالاترین ترکیب‌پذیری (حدود ۳۵ هیبرید) بهدست آمد تنها دو هیبرید در گروه نتاج مقاوم قرار گرفت. این موضوع نشان می‌دهد که ژن‌های عامل مقاوم در این رقم‌های به نتاج منتقل نشده‌اند.

از هیبریدهای مقاومی که بر اساس نمره زردی برگ و شاخص آلوگی به ریزومانیا انتخاب شدند، در رابطه با رقم شماره سه به نسبت مساوی چهار هیبرید برای پایه‌های مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ بهدست آمد. در رقم شماره هفت این نسبت مساوی برای دو پایه مادری و معادل هشت عدد بود. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رقم‌هایی مثل رقم شماره شش، والد پدری مناسبی برای انتقال ژن‌های مقاوم نیستند و یا ژنتیپ‌ها برای ژن مقاوم هتروزیگوت بودند (جدول ۳).

ارزیابی شاخص‌های زردی برگ و آلوگی ریشه بیماری ریزومانیا
الف- نمره زردی
هیبریدهای بهدست آمده از والد مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ از نظر نمره زردی برگ در طول فصل رشد با

ژنتیپ‌های مقاوم به بیماری در داخل جمعیت‌های در حال تفرق که بهترادگر با مواد گیاهی زیبادی روبرو است، شاخص وضعیت عالیم بیماری روی ریشه معیار مناسبی محسوب می‌شود.

از مجموع ۲۹۶ هیبرید تهیه شده، بیشترین تعداد مربوط به والد پدری شماره چهار و شش در تلاقی با رگه ۲۳۱ (به میزان شش درصد) و در تلاقی با رگه ۲۶۱ (به میزان ۷/۷ درصد) بود. به طور متوسط، کمترین تعداد مربوط به رقم شماره هشت (به میزان ۲/۷ درصد با لاین ۲۳۱ و ۱/۷ درصد با لاین ۲۶۱) بهدست آمد (جدول ۳). با توجه به این که شرایط تولید بذر برای کلیه والدهای پدری تقریباً مشابه بود، اختلاف زیادی بین والدهای پدری از نظر تولید بذر هیبرید وجود داشت که این موضوع به ساختار ژنتیکی والدهای گردafaشان از نظر ترکیب‌پذیری بازمی‌گردد (Sadeghian et al. 1993).

از ۴۸ نتاج انتخابی مقاوم - بر اساس رنگ برگ - بیشترین تعداد معادل ۲۱ هیبرید (۸۰/۸ درصد) مربوط به رقم شماره هفت و ۱۲ هیبرید (۴۰ درصد) مربوط به والد پدری شماره سه بود. از والد پدری شماره هشت هیچ‌گونه بذر مقاومی بهدست نیامد (جدول ۳). با توجه به آلوگی ظاهری ریشه‌ها، حدود ۳۱ هیبرید انتخاب شد. بیشترین تعداد (۱۵ هیبرید) یعنی حدود ۵۷/۷ درصد مربوط به والد پدری شماره هفت بود. همه نتاج حاصل از رقم‌های شماره دو، هشت، ۱۰ و ۱۱ در گروه رقم‌های حساس قرار گرفتند.

متحمل وجود داشت. به طوری که میانگین نمره زردی هیبریدهای حاصل از لاینهای مادری به صورت معنی‌داری نسبت به هر دو شاهد پایین‌تر بود (جدول ۴).

یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. متوسط امتیاز زردی برگ برای هیبریدهای حاصل از پایه مادری ۲۶۱ و ۲۳۱ به ترتیب ۲/۲۳۱ و ۲/۲۵ بود، ولی اختلاف بین والدین مادری ۲۳۱ و ۲۶۱ با شاهدهای مقاوم و

جدول ۴ شاخص نمره زردی برگ‌ها و درصد آلدگی ریشه به ریزومانیا در نتاج والد مادری ۲۶۱ و ۲۳۱

نمره زردی(-۰)	آلدگی ریشه به ریزومانیا(%)	اوریژن
۲/۲۵ b*	۲۵ b	والد مادری ۲۳۱
۲/۳۶ b	۲۲ b	والد مادری ۲۶۱
.۰/۰ a	۹ a	شاهد متحمل (بالک شیراز)
.۰/۰ a	. a	شاهد مقاوم (دورتی)

* مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون LSD در سطح پنج درصد.

نمره زردی - یا به عبارتی حساس‌ترین آن‌ها - هیبریدهای حاصل از رقم‌های شماره‌های هشت، نه و شش بود و مقاوم‌ترین آن‌ها، هیبریدهای حاصل از رقم‌های شماره هفت و سه بود (جدول ۵).

بين نتاج والدین گردهافشان اختلاف شدید و معنی‌داری از نظر نمره زردی در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت. کمترین نمره زردی مربوط به رقم‌های شماره هفت و سه به ترتیب به میزان ۰/۹۹ و ۱/۵۸ و نمره شاهد مقاوم معادل ۰/۰۲ بود. بیشترین


جدول ۵ گروه‌بندی میانگین نمره زردی برگ‌ها و شاخص آلدگی به ریزومانیا در والد پدری رقم‌های تجاری

اوریژن	درصد شاخص آلدگی به ریزومانیا	متوسط نمره زردی در کل فصل	
۱	۶۰ c	۲/۵۲ defg*	
۲	۱۰۰ c	۲/۴۱ def	
۳	۲۴ c	۱/۵۸ c	
۴	۳۷ c	۲/۵۶ defg	
۵	۱۷ c	۲/۲۰ d	
۶	۶۲ c	۲/۷۸ g	
۷	۱۵ b	.۰/۹۹ b	
۸	۱۰۰ c	۲/۷۱ efg	
۹	۵۹ c	۲/۷۵ fg	
۱۰	۱۰۰ c	۲/۵۹ defg	
۱۱	۱۰۰ c	۲/۳۳ de	
شاهد متحمل (بالک شیراز)	۹ a	.۰/۰۵ a	
شاهد مقاوم (دورتی)	۱ a	.۰/۰۲ a	

* اعداد دارای حروف مشابه براساس آزمون LSD در سطح پنج درصد اختلاف معنی‌دار ندارند.

رقم‌های مقاوم بر اساس نمره زردی برگ حدود ۱۱۰ روز پس از کاشت است. در این زمان، بیشترین اختلاف بین رقم‌های مقاوم و حساس از نظر رنگ‌پریدگی برگ وجود داشت (شکل ۱).

به‌طورکلی در اکثر هیبریدها مقدار زردی در ابتدای فصل رشد بسیار کم ولی در اواسط فصل رشد به حداکثر خود رسید و مجدداً در انتهای فصل رشد روند نزولی پیدا کرد. با توجه به الگوی زرد شدن برگ‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بهترین زمان انتخاب



شکل ۱ رابطه تعییرات زردی برگ هیبریدهای چندرقند در طول فصل رشد در شرایط آلودگی به ریزومانیا

یکدیگر و بهتری معادل ۰/۲۵ و ۰/۲۲ درصد بود و در مقایسه با شاهد مقاوم (دورتی) در گروه آماری بالاتری قرار داشت. این موضوع نشان داد با وجود این‌که هیبریدهای پایه ۲۶۱ عالیم زردی بیشتری داشتند، ولی ریشه هیبریدهای مقاوم برداشت شده از این پایه، از عالیم ریزومانیای کمتری در روی ریشه برخوردار بودند (جدول ۴).

والدین گردهافشان از حیث شاخص آلودگی به بیماری ریزومانیا با یکدیگر اختلاف معنی‌داری در سطح پنج درصد داشتند و تنها هیبریدهای حاصل از رقم شماره هفت، کمترین آلودگی (به میزان ۱۵ درصد) را

همان‌طور که قبلاً نیز ذکر شد، زرد شدن برگ‌ها یک شاخص مشاهده‌ای دقیق در شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم در تمام مراحل رشد گیاه نیست. در حالت کلی، زردی هیبریدهای حاصل از والدهای مادری ۲۶۱ نسبت به ۲۳۱ اندکی بالاتر بود.

ب- شاخص آلودگی به بیماری ریزومانیا
بین نتاج لاین‌های ۲۳۱ و ۲۶۱ از حیث شاخص آلودگی، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در عین حال، اختلاف میانگین نتاج این والدین در مقایسه با شاهدهای مقاوم و حساس معنی‌دار بود. میزان آلودگی در میانگین نتاج والدین ۲۳۱ و ۲۶۱ نزدیک به

تولید تعداد نتاج به دست آمده در تلاقي با پايه مادرى اختلاف معنى داری داشتند، ولی والدين مادرى از اين حيث با يكديگر اختلاف معنى داری نداشتند. از نظر انتفال مقاومت از پايه های گردهافشان به هيبريدها، اختلاف خيلي زيادي در بين والدين پدرى وجود داشت. رقم تجارى شماره هفت و سه بيشترین مقاومت را به هيبريدها منتقل کردند ولی والدين مادرى ۲۳۱ و ۲۶۱ از اين حيث اختلاف ناچيزی داشتند. از نظر شاخص های زردي در بين نتاج حاصل از پايه های گردهافشان، اختلاف معنى داری در بين والدين پدرى وجود داشت، ولی بين والدين مادرى اختلاف زيادي وجود نداشت. از نظر شاخص آلدگى ريشه به ریزومانیا بين والدين مادرى اختلاف زيادي نبود ولی بين پايه های گردهافشان اختلاف معنى داری وجود داشت. از آنجايی كه، چندر قند يك گياه زراعي با سابقه تقربياً ۲۰۰ ساله است، ظرفیت ژنتیکی بسيار محدودی در مقایسه با گیاهانی مثل ذرت و يا جو دارد. بنابراین، به دليل محدود بودن خزانه ژنتیکی اين گياه، افزایش تنوع ژنتیکی و يا ظرفیت ژنتیکی آن با معرفی ژن های مفید از ساير گونه های جنس *Beta* و يا رقم های تجاری (Bosemark 1979; Panella and Lewellen 2007) موجود بسيار مفيد است. در راستاي اين هدف در اين پروژه، تعداد ۳۱ ژرمپلاسم مقاوم معرفی شدند كه محققين بهنژادی می توانند در برنامه های کوتاه مدت و يا ميان مدت خود از ژن های مفید موجود در اين مواد ژنتیکی- كه خاصیت گردددهی مناسب و در واقع تركيب پذيری بالايی در جهت تولید نتاج بارور دارند- استفاده کنند.

دارا بود (جدول ۵) و اين در حالی بود که در رقم شاهد مقاوم، مقدار آن برابر يك درصد بود. در نتاج گردهافشان های شماره دو، هشت، ۱۰ و ۱۱ بيشترین ميزان آلدگی به بيماري ریزومانیا (برابر با ۱۰۰ درصد) مشاهده شد. در نتاج حاصل از رقم های شماره پنج و سه، مقدار آلدگی به بيماري ریزومانیا تا حدی پايان بود (جدول ۵).

خصوصيات هيبريدهای مقاوم انتخابی

هيبريدهای تولیدی که در مزرعه آلدود کشت شدند و آن هایی که دارای مقاومت به بيماري ریزومانیا و پوسیدگی ريشه بودند، طی دو مرحله در هنگام برداشت در مزرعه و مجدداً در هنگام سيلوي ريشه ها، بر اساس مشاهدات مزرعه های (شاخص آلدگی به بيماري ریزومانیا و نمره زردي و ...) انتخاب شدند. در هنگام برداشت، تعداد ۳۱ شماره بذر هيبريد انتخاب و مجدداً در انتخاب هنگام سيلوي کردن ريشه ها به ۲۰ شماره تقليل پيدا کرد. اين ۲۰ شماره بذر هيبريد، پس از سيلوي در اسفند همان سال در محیط ايزوله کشت و در اواخر تابستان بذر آنها به صورت بالک برداشت شد. از اين ۲۰ هيبريد در پروژه های اصلاحی جديداً استفاده شد (جدول ۷).

نتيجه گيري

رقم های گردهافشان از حيث نمره زردي، يكتواختی و گل دهی و ميزان دانه گرده با يكديگر تفاوت های ظاهری دارند. والدين گردهافشان از نظر

جدول ۷ درصد آلودگی به ریزومانیا و شاخص نمره زردی برگ طی فصل رشد در هیبریدهای مقاوم انتخابی

ردیف	هیبرید تولیدی	اول فصل	اواسط فصل	پایان فصل	میانگین	آلودگی به بیماری رایزومانیا	انتخاب در مزرعه (برداشت)	انتخاب برای (سیلو)
		والد مادری	والد پدری	نمودار زردی (۰-۴)		شاخص (%)		
۱	۵	۲۳۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۰	بله
۲	۷	۲۳۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۰	بله
۳	۳	۲۳۱	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۰/۰	بله
۴	۳	۲۶۱	۳/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۰/۰	بله
۵	۷	۲۶۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۰	۰/۰	بله
۶	۷	۲۳۱	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۰/۰	بله
۷	۷	۲۶۱	۲/۰	۲/۰	۱/۰	۱/۷	۰/۰	بله
۸	۷	۲۶۱	۳/۰	۳/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۱	بله
۹	۷	۲۳۱	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۰/۱	بله
۱۰	۷	۲۶۱	۲/۵	۳/۰	۳/۰	۲/۸	۰/۱	بله
۱۱	۷	۲۶۱	۳/۵	۲/۰	۴/۰	۳/۲	۰/۱	بله
۱۲	۷	۲۶۱	۴/۰	۳/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۲	بله
۱۳	۴	۲۳۱	۳/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۰/۲	بله
۱۴	۷	۲۳۱	۴/۰	۳/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۲	بله
۱۵	۳	۲۶۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۰	۰/۲	بله
۱۶	۷	۲۶۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۳	۰/۲	بله
۱۷	۷	۲۶۱	۴/۰	۳/۰	۴/۰	۳/۷	۰/۲	بله
۱۸	۳	۲۳۱	۲/۰	۲/۰	۲/۰	۲/۳	۰/۳	بله
۱۹	۳	۲۶۱	۲/۰	۲/۰	۱/۰	۱/۷	۰/۴	بله
۲۰	۳	۲۳۱	۴/۰	۲/۵	۴/۰	۳/۵	۰/۴	بله
۲۱	۷	۲۳۱	۴/۰	۲/۰	۴/۰	۳/۳	۰/۵	بله
۲۲	۵	۲۶۱	۲/۵	۲/۰	۴/۰	۲/۸	۰/۵	بله
۲۳	۷	۲۳۱	۰/۵	۰/۰	۱/۰	۰/۵	۰/۵	بله
۲۴	۴	۲۳۱	۲/۵	۲/۰	۲/۰	۲/۵	۰/۵	بله
۲۵	۷	۲۳۱	۳/۵	۳/۰	۴/۰	۳/۵	۰/۹	بله
۲۶	۳	۲۶۱	۳/۰	۱/۰	۴/۰	۲/۷	۰/۹	بله
۲۷	۳	۲۳۱	۳/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۳	۰/۹	بله
۲۸	۹	۲۳۱	۲/۵	۱/۰	۳/۰	۲/۲	۱/۵	بله
۲۹	۱	۲۶۱	۳/۰	۲/۰	۳/۰	۲/۷	۱/۵	بله
۳۰	۶	۲۳۱	۱/۵	۱/۰	۲/۰	۱/۵	۱/۶	بله
۳۱	۴	۲۶۱	۱/۵	۱/۰	۲/۰	۱/۵	۱/۸	بله
۳۲	بالک شیراز(شاهد متهم)		۴/۰	۱/۰	۴/۰	۴/۰	۰/۱	
۳۳	شاهد حساس (رسول)		۳/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۱۰۰	
۳۴	شاهد مقاوم (دورتی)		۴/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۰/۰	

ریبعی و مهندس سالاری خواه) و مدیریت بخش چندرقند و تکنسین های بخش چندرقند (آقایان جواد محزونی و حسین محمدی حزا) به خاطر زحمات بی دریغانه اشان تشکر و قدردانی می شود.

تشکر و قدردانی

از مدیریت مؤسسه تحقیقات چندرقند و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی که امکانات اجرای پروژه را فراهم کردند و همچنین از مدیریت و کارشناسان کارخانه قند جام (آقایان مهندس

References:

منابع مورد استفاده:

- توده‌فلاح، م. ارجمند، م. ن. و محمودی س. ب. ۱۳۷۹. بررسی وضعیت آلدگی و پراکنش بیماری ریزومانیا چندرقند در ایران. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان جلد دوم ص ۷۲.
- ایزدپناه، ک. هاشمی، پ. کامران، ر. و معصومی، م. ۱۳۷۵. وجود گستردگی بیماری ریشه‌ریشی چندرقند (شبه ریزومانیا) در فارس. بیماری‌های گیاهی، جلد ۳۲. ص ۲۰۰.
- جعفریبور، ب. و فلاحتی رستگار، م. ۱۳۷۹. شیوع بیماری ریزومانیا در استان خراسان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان. جلد دوم صفحه ۷۳.
- دارابی، س. ۱۳۷۷. تشخیص، خالص‌سازی و پراکندگی ویروس عامل ریشه‌گنایی چندرقند در فارس و برخی استان‌های دیگر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. ص ۱۰۹.
- Amiri R, Moghaddam M, Mesbah M, Sadeghian SY, Izadpanah K. The inheritance of resistance to beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): In *B. vulgaris* subsp. *maritima*, accession WB42: Statistical comparisons with Holly-1-4. *Euphytica*. 2003; 132: 363-373.
- Asher MJC. Rhizomania. In: Cooke DA and Scott RK (Eds). The Sugar Beet Crop. Science into Practice. 1993; PP 311-346. Chapman & Hall, London.
- Asher MJC, Chwarszczynska DM, Leaman M. The evaluation of rhizomania resistant sugar beet for the UK. *Ann. Appl. Biol.* 2002; 141: 101-109.
- Asher MJC, Chwarszczynska DM, Leaman M. The evaluation of rhizomania resistant sugar beet for the UK. *Annals of Applied Biology*. 2003; 141: 101–109.

- Biancardi E, Lewellen RT, De Biaggi M, Erichsen AW, Stevanato P. The origin of rhizomania resistance in sugar beet. *Euphytica*. 2002; 127: 383–397.
- Bosemark NO. Genetic poverty of the sugar beet in Europe. Proc. Conf. Broadening Genet. Base Crops. Wageningen, 1978. Pudoc, Wageningen. 1979.
- Bosemark NO. Genetics and breeding. In: Cooke DA and Scott RK (Eds). *The Sugar Beet Crop. Science into Practice*. 1993; PP 311-346. Chapman & Hall, London.
- Gidner S, Lennefors BL, Nilsson NO, Bensefelt J, Johansson E, Gyllenspetz U, Kraft T. QTL mapping of BNYVV *resistance* from the WB41 source in sugar beet. *Genome*. 2005; 48: 279–285.
- Grimmer MK, Kraft T, Francis SA, Asher MJC. QTL mapping of BNYVV resistance from the WB258 source in sugar beet. *Plant Breeding*. 2008.
- Graham RD, McGrann T, Grimmer MK, Mustasa-Gottgens ES, Stevens M. Plant diseases that changed the world. Progress towards the understanding and control of sugar beet, rhizomania disease. *Molecular Plant Pathology*. 2009; 10(1): 129–141.
- Lein JC, Asbach K, Tian Y, Schulte D, Li C, Koch G, Jung C, Cai D. Resistance gene analogues are clustered on chromosome 3 of sugar beet and cosegregate with QTL for rhizomania resistance. *Genome* 50: 61—71.
- Lewellen, RT. Performance of near-isolines of sugarbeet with resistance to rhizomania from different sources. Proceedings of the 58th Congress of the IIRB. 1995; PP. 83–92. Institut International de Recherches Betteravieres, Brussels.
- Lewellen RT, Skoyen IO, Erichsen AW. Breeding sugar beet for resistance to rhizomania: evaluation of host-plant reactions and selections for and inheritance of resistance. In: Proceedings of the 50th Winter Congress of the IIRB, 1987. International Institute for Beet Research, Brussels. 1987; pp 139–156.
- Nielsen SL, Nicolaisen M, Scheel C, Dinesen IG. First record of beet necrotic yellow vein virus in Denmark. *Plant Disease*. 2001; 85: 559.

- Panella L, Lewellen RT. Broadening the genetic base of sugar beet: Introgression from wild relatives. *Euphytica*. 2007; 154: 382–400.
- Panella L, Lewellen RT, Linda E. Breeding for multiple disease resistance in sugar beet: Registration of FC220 and FC221. *Journal of Plant Registrations*. 2008; 2: 146-155.
- Pferdmenges F, Korf H, Varrelmann M. Breaking of Beet necrotic yellow vein virus resistance in sugar beet is independent of virus and vector inoculum densities. *European Journal of Plant Pathology*. 2008; Doi: 10.1007/s10658-008-9408-9.
- Rush CM. Ecology and epidemiology of Benyviruses and plasmodiphorid vectors. *Annual Review of Phytopathology*. 2003;41: 567–592.
- Rush CM, Heidel G. Furovirus diseases of sugar beets in the United States. *Plant Dis*. 1995; 79: 868-875.
- Rush CM, Liu HY, Lewellen RT, Acosta-Leal R. The continuing saga of rhizomania of sugar beets in the United States. *Plant Dis*. 2006; 90: 4–15.
- Sadeghian SY, Becker H, Johansson E. Inheritance of bolting in three sugar beet crosses after different period of verbalization. *Plant reeding*. 1993; 110: 328-333.
- Scholten OE, Jansen RC, Keizer LCP, De Bock TSM, Lange W. Major genes for resistance to Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) in *Beta vulgaris*. *Euphytica*. 1996; 91: 331–339.
- Scholten OE, Lange W. Breeding for resistance to rhizomania in sugar beet: A review. *Euphytica*. 2000; 112: 219–231.
- Steddom K, Heidel G, Jones D, Rush C M. Remote detection of rhizomania in sugar beets. *Phytopathology*. 2003; 93:720-726.
- Tamada T. Beet necrotic yellow vein virus. *CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses*. 1975; No. 144.
- Tuitert G. Assessment of the inoculum potential of *Polomyxa betae* and beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) in soil using the most probable number method Netherlands, *Journal of Plant Pathology*. 1990; 96: 331–341b.